



РЕКОМЕНДАЦИЯ РОДИТЕЛЯМ И ПАЦИЕНТУ ПЕРЕД ПРЕДСТОЯЩИМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ ПОД ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИЕЙ

Уважаемые родители!

Для безопасности вашего ребенка следуйте представленным ниже инструкциям.

Прием воды и пищи. Во избежание рвоты и осложнений во время общей анестезии не позволяйте ребенку нарушать следующие рекомендации:

- Не принимать тяжелую пищу после полуночи перед лечением
- За 6 часов до лечения не принимать пищи
- За 4 часа до лечения не принимать воды.

Изменения в состоянии здоровья. Любые изменения в состоянии здоровья ребенка, в том числе просто лихорадка, за 7 дней до лечения имеют большое значение. Для безопасности: ребенка нужно посетить врача. Проинформируйте нас о возникших изменениях в состоянии ребенка перед визитом.

Профилактические прививки. За 14 дней до лечения и 14 дней после лечения не рекомендуется проведение профилактических прививок. Если лечение вашего ребенка совпадает с графиком профилактических прививок, одно из лечебных мероприятий необходимо перенести.

Консультация анестезиолога. Консультация и осмотр анестезиолога обязательны. Первичная консультация может производиться по телефону, однако в день лечения предоперационный осмотра и консультация анестезиолога обязательны.

Прибытие в клинику. Законный представитель должен сопровождать ребенка по пути в стоматологическую клинику и остаться там на время лечения. Планируйте прибыть заранее.

Прием лекарственных препаратов. График приема лекарственных препаратов, которые ваш ребенок принимает постоянно, в день лечения необходимо согласовать с анестезиологом и в лечащим врачом. Не давайте ребенку никаких лекарственных средств до и лечения без консультации с врачом.

Физическая активность. Не планируйте никакой физической деятельности для ребенка после лечения. Ребенок должен отдыхать. Пристально наблюдайте за ребенком в течение дня после лечения!

Транспортировка домой. Ребенка должен сопровождать взрослый. За ребенком нужно присматривать и наблюдать во время транспортировки.

Прием жидкости и пищи после проведенного лечения. В качестве питья после лечения рекомендована простая вода. Затем можно ребенку сладкие напитки (фруктовые соки). Затем можно давать негорячую пищу.

Повышение температуры тела. В первые сутки после лечения возможно повышение температуры тела, дайте ребенку препараты на основе парацетамола или ибупрофена для ее снижения, а в случае повышения температуры тела выше 38°, необходимо обратиться к врачу.

Обращение к врачу в случае. При наличии рвоты в течение 4 часов, повышения температуры тела выше 38° и на срок более 24 часа, затрудненном дыхании ребенка.

По любым другим вопросам, касающимся здоровья ребенка, проведенного лечения

